

DÅRLIGE RUGERESULTATER OG HJÆLPEMIDLER

Symptomer	Sandsynlige årsager	Hjælpemidler
Klart æg Ingen blodring eller ansats til foster	1. For dårlig avlshane 2. Æggene for gamle 3. Avls-hønerne for magre 4. Avls-hønerne går for tæt	1. Haner med god livskraft 2. Æggene højst 10 dage gammel 3. Hold høner i god foderstand
Klart æg ved gennemlysning, men viser blod eller meget lille foster i udvikling	1. For høj rugetemperatur 2. Æggene opbevares for koldt 3. Avlsdyrene ud af kondition (frossen kam etc.) 4. Vitaminmangel	1. Regulér temperaturen 2. Beskyt æggene mod for lav temperatur 3. Benyt ikke æg fra høner med frossen kam eller med smitsom sygdom 4. Giv tran eller tørvitamin og lucernegrønmel (hønerne lidt hvedekimsolie)
Dødt foster: 12. til 18. dagen 3. dagen 7. til 10. dagen 14. til 19. dagen	1. Forkert rugetemperatur 2. Mangelfuld ventilation 3. Forkert fodring 4. Riboflavin-mangel 5. D-vitamin-mangel	1. Nøjagtig temperaturregulering 2. God ventilation af rugemaskinen og frisk luft i rugerummet 3. Giv majs, mælk, lucernegrønmel og tran eller tørvitamin
Velskabt kylling, men død uden at bryde skallen	1. Forkert vending af æggene 2. Arveligt 3. Forkert rugetemperatur	1. Vend æggene 5 gange dagligt 2. Omhyggelig valg af avlshøner 3. Regulér rugetemperaturen i rugemaskinen
Ægget brudt, men kyllingen død i skallen	1. Lav gennemsnitsfugtighed 2. Lav gennemsnitstemperatur 3. Pludselig høj temperatur i kort periode	1. Hæv fugtigheden 2. Bevar den rigtige rugetemperatur, 37,8 grader celsius under hele rugningen (kun for motorrugere) 3. Pas på temperaturchok
Fastsiddende kylling. Skallen klæber til kyllingen	1. Æggene tørre for meget 2. Lav fugtighed under klækning	1. Fugtigheden hæves under klækningen
Klæbende kyllinger. Kyllingerne indsmurt i æg-indholdet	1. Lav gennemsnitstemperatur 2. Lille luftblære pga. for høj gennemsnitsfugtighed	1. Regulér temperaturen 2. Bedre ventilation og mindre fugtighed
Navle-kyllinger: Kyllinger der ikke på naturlig måde har opsuget blommesækken	1. For høj temperatur eller for høje temperatursvingninger 2. Lav fugtighed	1. Omhyggelig temperaturregulering 2. Rigtig fugtighed
For små kyllinger	1. Små æg 2. Lav fugtighed 3. Høj temperatur 4. Riboflavin-mangel	1. Rug ikke æg under standardvægten 2. Hold rigtig fugtighed 3. Regulér rugetemperaturen 4. Giv avlshønerne riboflavin
Store blød-lemmede kyllinger	1. Lav gennemsnitstemperatur 2. Dårlig ventilation	1. Passende rugetemperatur 2. Rigtig ventilation
Døde, ildelugtende kyllinger i klækkeskuffen	1. Navlen inficeret i rugemaskinen	1. Omhyggelig desinfektion mellem rugningerne
For tidlig klækning eller forlænget klækning	1. For høj temperatur	1. Temperaturkontrol
Forlænget klækning	1. For høj temperatur	1. Temperaturkontrol
Forsinket klækning. Æggene klækker ikke før 21. dagen eller senere	1. For lav gennemsnitstemperatur	1. Temperaturkontrol. Efterprøv termometret
Forkrøblede kyllinger Korsnæb	1. Arveligt	1. Omhyggelig udvælgelse af avlsdyr
Mangler øjne	1. Tilfældigt	1.
Krumme tæer	1. Forkert temperatur 2. Riboflavin-mangel	1. Temperaturkontrol 2. Giv avlshønerne mere riboflavin
Forkert fosterstilling	1. Æggets stilling under rugning 2. Tidspunktet på dagen, ægget er lagt	1. Ægget anbragt rigtigt i bakken og vendt regelmæssigt 2. Ikke kendt