



Brugsvejledning i husdyrproduktion

Bredspektret desinfektionsmiddel

Dokumenteret effekt mod oocyster (cryptosporidier og coccidier), nematode æg(orm), sygdomsfremkaldende virus, bakterier, gær og svampe

V-Oocid® er et omkostningseffektivt valg, når der ønskes kraftig og bredspektret effekt især mod Oocyster (cryptosporidier og coccidier). Sammensætningen af produktet giver dobbelt virkning pga. indholdet af Glykolsyre. Glykolsyre trænger ind i keratiniserede væv. I parasitære oocyster forstyrrer dette oocysten's struktur og dets beskyttende lag. Glykolsyre forstyrrer dermed overfladens kemiske sammensætning, hvilket påvirker struktur og levedygtighed af parasitære oocyster. Glykolsyre skaber dermed en lettere adgang igennem den hårde oocystvæg, for det biocidaktive stof clorcesol. Denne unikke dobbeltvirkende sammensætning gør at V-Oocid® dræber de sporulerede Oocyster med op til 98,9%

Desinfektionsmiddel til bygninger uden dyr tilstede; overflader og inventar i husdyrbrug, fodtøj, transportmidler og køretøjer. Biocid PT3(Produkttype 3)


Primære anvendelsesområder i Husdyrproduktion:

V-Oocid anvendes til:

- Desinfektion af Fjerkræstalde, kalvehytter, kælvningsbokse og farestier
- Desinficerende støvlebad
- Desinfektion af transportmidler og køretøjer (traktorer og maskiner)
- Desinfektion omkring kadaverpladser

V-Oocid® reducerer Oocyst populationen med 98,9%:

**2% opløsning udlagt som
skum med indvirkningstid
på 2 timer**





| Anvendelse | Koncentration | Produkt Type | Dosering |
|---|------------------------|--------------|---|
| Desinfektion af overflader mod: Oocyster Cryptosporidier Coccidier Nematode æg (orm) | 2,0% (20ml/L vand) | PT3 | Anvend en højtryksrensers eller andet mekanisk sprøjteudstyr med lavt tryk. Ved fladedesinfektion anvend 200-400 ml/m ² eller indtil det begynder at løbe. Desinficer op til over dyrenes højde. Lad desinfektionen virke i 2 timer. Ved temperaturer under 10 grader forlæng virketiden. Opløsningen kan også anvendes til nedsænkning af løst inventar og udstyr. |
| Desinfektion af overflader mod: Virus, bakterier og svampe | 1,5% (15 ml/L vand) | PT3 | Anvend en højtryksrensers eller andet mekanisk sprøjteudstyr med lavt tryk. Ved fladedesinfektion anvend 100-300 ml/m ² eller indtil det begynder at løbe. Lad desinfektionen virke i 60 min. Ved temperaturer under 10 grader, forlæng virketiden. Opløsningen kan også anvendes til nedsænkning af løst inventar og udstyr. |
| Desinfektion af transportmidler, køretøjer og hjul | 2,0% (20 ml/L vand) | PT3 | Anvend en højtryksrensers eller andet mekanisk sprøjteudstyr med lavt tryk. Tilfør V-Oocid® opløsningen med 100 - 200ml/m ² , eller til overfladen er gennemfugtet og til væsken begynder at løbe. Lad desinfektionen virke i 5 min. Ved temperatur under 10 grader forlæng virketiden. |
| Støvlebad | 2% (20ml/L vand) | PT3 | Virketid 1 min. Ved temperatur under 10 grader forlæng virketiden. Udskift opløsningen enten når den er meget snavset eller efter 100 passager/efter 7 dage. |

| Total mængde færdigblandet desinfektionsopløsning | Blandings procent | |
|---|--------------------------------------|-------|
| | 2,0 % | 1,5% |
| | Mængde af V-Oocid der skal tilsættes | |
| 10L | 200ml | 150ml |
| 50L | 1000ml | 750ml |
| 100L | 2 L | 1,5 L |
| 200L | 4L | 3 L |

Rengør først for synligt snavs ved at vaske med den tilhørende sæbe (DT Foam) inden desinfektion.



Støvlebad:



Mærkning af biocidholdige produkter (forordning (EF) nr. 528/2012) :

Produkttype 3: Veterinærhygiejne. Flydende. Biocidaktivstof:

Chlorcresol (CAS: 59-50-7) 170.00 g/kg - Glykolsyre (CAS: 79-14-1) 49.00 g/kg HUVEPHARMA SA, 34 rue Jean Monnet • Z.I. d'Étriché • Segré • 49500 SEGRÉ-EN-ANJOU BLEU • FRANCE • Tel.: +33 (0)2 41 92 11 11 • info.france@huvepharma.com

FORHOLDSREGLER

Brug desinfektionsmidler sikkert. Læs altid etiketten og produktinformationer før brug. Opbevares koldt og tørt med tæt lukket låg. Lad ikke koncentrat eller opløsninger løbe direkte i vandløb. Bland ikke med andre kemikalier, undtagen dem som er anbefalet af fabrikanten. Skyl udstyr efter brug.

Anvend rent og korrekt vedligeholdt personligt beskyttelsesudstyr ifølge obligatoriske piktogrammer herunder. Ved sprøjtning skal der anvendes partikelfilter P2(hvid) mod dampe og partikler.



FØRSTEHJÆLPSFORANSTALTNINGER

Generelt: Hvis gener/symptomer fortsætter eller i tvivlstilfælde søges læge.

Inhalering: Flyt personen til frisk luft. Kontakt læge ved indåndingsbesvær.

Hudkontakt: Vask straks med rigeligt vand. Kontakt en læge hvis huden er skadet.

Øjenkontakt: Skyl straks med rigeligt vand og søg læge. Vis etiketten.

Indtagelse: Forsøg ikke at få personen til at indtage noget. Til kald lægehjælp, og vis etiketten.

Leverandør:

Firma : HUVEPHARMA SA.

Adresse : 34 rue Jean Monnet , Z.I. d'Etriché, Segré .49500.SEGRE-EN-ANJOU BLEU.France.

Telefon : +33 (0) 2 41 92 11 11. Fax : +33 (0) 2 41 61 04 59.

E-mail : info.france@huvepharma.com

Giftlinien DK : 82 12 12 12

Pakning: 5 L